



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

Σχετικά με την απεικονιστικά καθοδηγούμενη με ακτινοθεραπεία διαμορφούμενης έντασης (IG-IMRT) (Image-Guided, Intensity-Modulated Radiation Therapy, IG-IMRT) για τον προστάτη σας

Αυτές οι πληροφορίες θα σας βοηθήσουν να προετοιμαστείτε για την IG-IMRT του προστάτη σας στη MSK. Θα σας βοηθήσουν να μάθετε τι να περιμένετε και πώς να φροντίσετε τον εαυτό σας πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ακτινοθεραπεία σας.

Διαβάστε το υλικό αυτό πριν ξεκινήσετε την ακτινοθεραπεία σας. Χρησιμοποιείτε το ως οδηγό τις ημέρες πριν από τις θεραπείες σας. Θα σας βοηθήσει να ετοιμαστείτε.

Σχετικά με την ακτινοθεραπεία

Η ακτινοθεραπεία χρησιμοποιεί ακτινοβολία υψηλής ενέργειας για τη θεραπεία του καρκίνου. Λειτουργεί καταστρέφοντας τα καρκινικά κύτταρα και καθιστώντας δύσκολο τον πολλαπλασιασμό τους. Το σώμα σας μπορεί τότε να ξεφορτωθεί φυσικά τα κατεστραμμένα καρκινικά κύτταρα. Η ακτινοθεραπεία επηρεάζει και τα φυσιολογικά κύτταρα, αλλά μπορούν να

αποκατασταθούν κατά τρόπο με τον οποίο δεν μπορούν τα καρκινικά κύτταρα.

Θα υποβληθείτε σε μία διαδικασία σχεδιασμού θεραπείας που λέγεται προσομοίωση πριν από την πρώτη σας ακτινοθεραπεία. Κατά την προσομοίωσή σας, οι ακτινοθεραπευτές σας θα κάνουν απεικονιστικές σαρώσεις. Επίσης, θα σημειώσουν τατουάζ με μικρές κουκκίδες στο δέρμα σας. Αυτά τα γίνονται για:

- Να χαρτογραφηθεί το σημείο θεραπείας σας.
- Φροντίστε να λαμβάνετε τη σωστή δόση (ποσότητα) ακτινοβολίας.
- Περιορίστε την ποσότητα ακτινοβολίας που φτάνει στους γειτονικούς υγιείς ιστούς σας.

Τι είναι η IG-IMRT;

Το IG-IMRT είναι ένας τύπος ακτινοθεραπείας με στοχευμένη εξωτερική δέσμη.

Κατά την εξωτερική ακτινοβολία δέσμης, ένα μηχάνημα θεραπείας στοχεύει δέσμες ακτινοβολίας απευθείας στον όγκο. Η δέσμη περνά μέσα από το σώμα σας και καταστρέφει καρκινικά κύτταρα στη διαδρομή της. Δεν θα δείτε ούτε θα νιώσετε την ακτινοβολία.

Τι σημαίνει το τμήμα «απεικονιστικά καθοδηγούμενη» της IG-IMRT;

«Απεικονιστικά καθοδηγούμενη» είναι οι εικόνες που λαμβάνονται κατά τις ακτινοθεραπείες σας και βοηθούν στην καθοδήγηση των δεσμών ακτινοβολίας.

Οι φυσιολογικές κινήσεις του σώματός σας μπορούν να κάνουν τον προστάτη σας να κινείται ελαφρώς κατά τη διάρκεια των θεραπειών σας ή μεταξύ των θεραπειών σας. Εξαιτίας τούτου, η IG-IMRT χρησιμοποιεί εικόνες που λαμβάνονται σε πραγματικό χρόνο για να διαμορφωθούν οι δέσμες ακτινοβολίας στον όγκο σας.

Η ομάδα υγειονομικής περίθαλψής σας θα τοποθετεί επίσης αναφορικούς δείκτες στον προστάτη σας πριν ξεκινήσετε την ακτινοθεραπεία. Οι δείκτες βοηθούν τους γιατρούς σας να βλέπουν τον προστάτη σας κατά τις θεραπείες σας.

Τι σημαίνει το «διαμορφούμενης έντασης» τμήμα της IG-IMRT;

Διαμορφούμενης έντασης είναι η ένταση των δεσμών ακτινοβολίας που μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια των ακτινοθεραπειών σας.

Το μηχάνημα ακτινοβολίας θα μετακινείται στο σώμα σας κατά τη διάρκεια των θεραπειών σας. Έτσι επιτρέπεται να στοχεύονται οι δέσμες ακτινοβολίας στον όγκο από πολλές γωνίες. Το μηχάνημα μπορεί να αλλάξει και το σχήμα της δέσμης κατά τη διάρκεια των θεραπειών σας. Έτσι αλλάζει η ένταση της δέσμης ούτως ώστε ο γιατρός σας να μπορεί να στοχεύσει τον όγκο σας και να αποφύγει τον υγιή ιστό σας.

Σχετικά με την ακτινοθεραπεία με ακτινοβολία

Μπορεί να λαμβάνετε ακτινοθεραπεία είτε μόνη της είτε με ορμονοθεραπεία. Το κατά πόσο ο γιατρός σας θα προτείνει ορμονοθεραπεία εξαρτάται από το στάδιο του καρκίνου.

Ο στόχος της ορμονοθεραπείας είναι να συρρικνωθεί ο προστάτης σας και να σταματήσει η ανάπτυξη του καρκίνου. Έτσι οι ακτινοθεραπείες έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Για να μάθετε περισσότερα, διαβάστε το *\Ορμονοθεραπεία κατά την ακτινοθεραπεία του προστάτη σας* (www.mskcc.org/el/cancer-care/patient-education/hormonal-therapy-people-prostate-cancer).

Ο ρόλος σας στην ομάδα ακτινοθεραπείας σας

Ο ομάδα ακτινοθεραπείας σας θα συνεργαστούν για να σας φροντίσουν. Αποτελείτε μέρος αυτής της ομάδας και ο ρόλος σας περιλαμβάνει:

- Να πηγαίνετε στα ραντεβού στην ώρα σας.
- Να κάνετε ερωτήσεις και να μιλήσετε για τους προβληματισμούς σας.

- Να ενημερώσετε κάποιον στην ομάδα περίθαλψης εάν παρουσιάζετε παρενέργειες.
- Να ενημερώσετε κάποιον στην ομάδα περίθαλψης εάν πονάτε.
- Να φροντίζετε τον εαυτό σας στο σπίτι:
 - Να σταματήσετε το κάπνισμα, εάν καπνίζετε. Η MSK έχει ειδικούς που μπορούν να σας βοηθήσουν. Για περισσότερες πληροφορίες για το [Tobacco Treatment Program \(Πρόγραμμα κατά του καπνίσματος\)](#) μας, καλέστε το 212-610-0507. Για το πρόγραμμα μπορείτε να ρωτήσετε και την νοσηλεύτριά σας.
 - Πίνοντας υγρά με βάση τις οδηγίες τις ομάδας περίθαλψής σας.
 - Αποφύγετε ορισμένα τρόφιμα και ροφήματα με βάση τις οδηγίες της ομάδας περίθαλψής σας.
 - Λήψη των φαρμάκων προετοιμασίας του εντέρου σας με βάση τις οδηγίες τις ομάδας περίθαλψής σας.
 - Διατηρώντας σχεδόν το ίδιο βάρος.

Τι συμβαίνει πριν την IG-IMRT στον προστάτη σας

Τοποθέτηση αναφορικών δεικτών

Πριν ξεκινήσετε την IG-IMRT, θα τοποθετηθούν 3 αναφορικοί δείκτες στον προστάτη σας. Οι αναφορικοί δείκτες είναι μικροσκοπικά χρυσά αντικείμενα. Βοηθούν έναν αξονικό τομογράφο να εντοπίσει τον προστάτη σας και τον όγκο.

Η ομάδα περίθαλψής σας στο Ουρολογικό Τμήμα θα τοποθετήσει τους αναφορικούς δείκτες στον προστάτη σας. Θα τους έχουν τοποθετήσει τουλάχιστον 5 ημέρες πριν ξεκινήσει το ραντεβού προσομοίωσής σας.

Μία νοσοκόμα θα σας καλέσει για να σας ενημερώσει για τη διαδικασία. Θα λάβετε και το υλικό *About Your Prostate Fiducial Marker Placement* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/about-your-prostate-fiducial-

[marker-placement](#)). Περιέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία.

Τράπεζα σπέρματος πριν από την ακτινοθεραπεία

Κατά την ακτινοθεραπεία σας, οι όρχεις σας θα εκτεθούν σε ακτινοβολία. Αυτό μπορεί να επηρεάσει την παραγωγή σπέρματός σας και την ικανότητά σας να αποκτήσετε βιολογικά τέκνα μετά την ακτινοθεραπεία. Εάν νομίζετε ότι μπορεί να θελήσετε να αποκτήσετε βιολογικά τέκνα, συνιστούμε να αποθηκεύσετε το σπέρμα σας σε τράπεζα πριν ξεκινήσετε τη θεραπεία.

Για να μάθετε περισσότερα, διαβάστε το *\Sperm Banking* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/sperm-banking) και το *\Building Your Family After Cancer Treatment: For People Born With Testicles* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/building-family-born-with-testicles).

Προετοιμασία εντέρου πριν από και κατά την ακτινοθεραπεία

Θα χρειαστεί να εκκενώσετε επιπλέον κόπρανα (κακά) από το σώμα σας για την προσομοίωσή σας και για τις ακτινοθεραπείες σας. Λέγεται προετοιμασία εντέρου. Η προετοιμασία εντέρου συμβάλλει να μειωθεί ο κίνδυνος παρενεργειών σας.

Πώς η προετοιμασία εντέρου μειώνει τον κίνδυνο παρενεργειών

Τα έντερά σας είναι το λεπτό έντερο, το παχύ έντερο (κόλον) και ορθό. Το ορθό σας είναι το σημείο όπου αποθηκεύονται τα κόπρανα πριν βγουν από το σώμα σας.

Τα έντερά σας μεγαλώνουν ή μικραίνουν με βάση το πόσο γεμάτα είναι. Όταν αλλάξουν μέγεθος, μετακινούν και τον ιστό και τα όργανα γύρω από αυτά, συμπεριλαμβανομένου του προστάτη και της ουροδόχου κύστης σας.

Με την προετοιμασία εντέρου αδειάζουν τα έντερά σας. Βοηθά τον όγκο και τους γειτονικούς υγιείς ιστούς να είναι στο ίδιο μέρος για την

προσομοίωση και τις θεραπείες σας. Έτσι θα παραμείνουν υγιείς οι ιστοί από την υπερβολική ακτινοβολία και θα μειωθεί ο κίνδυνος παρενεργειών.

Προμήθειες για προετοιμασία εντέρου

Θα χρειαστείτε αυτές τις προμήθειες:

- Διαλυτό συμπλήρωμα ινών με Μεθυλο-κυτταρίνη, όπως σκόνη Citrucel®.
- Δισκία 125 χιλιοστογράμμων (mg) σιμεθικόνης, όπως Gas-x® Extra Strength.
- Αλατούχος υποκλυσμός, όπως το Fleet® saline enema.

Μπορείτε να τα αγοράσετε στο κατά τόπους φαρμακείο σας χωρίς συνταγή.

Οδηγίες για προετοιμασία εντέρου

Είναι πολύ σημαντικό να ακολουθήσετε τις οδηγίες προετοιμασίας εντέρου σας. Εάν το έντερό σας δεν είναι άδειο πριν από την προσομοίωση και τις θεραπείες σας, μπορεί να χρειαστείτε επιπλέον κλύσμα. Επίσης, μπορεί να καθυστερήσει την προσομοίωση ή τη θεραπεία σας.

Ένα μέλος της ομάδας ακτινοθεραπείας σας θα σας πει ακριβώς πότε να ξεκινήσετε την προετοιμασία του εντέρου σας. Θα ξεκινήσετε τουλάχιστον 3 ημέρες πριν από το ραντεβού προσομοίωσής σας.

- Να παίρνετε 1 κουταλιά της σούπας σκόνης μεθυλο-κυτταρίνης καθημερινά. Να την αραιώνετε σε υγρό ακολουθώντας τις οδηγίες στη συσκευασία.
- Να πάρετε 2 δισκία σιμεθικόνης (125 mg) το βράδυ πριν από τα ραντεβού σας για προσομοίωση και θεραπεία.
- Να πάρετε 2 δισκία σιμεθικόνης (125 mg) περίπου 2 ώρες πριν από τα ραντεβού σας για προσομοίωση και θεραπεία.

Γενικές οδηγίες διαίτας για να ελαχιστοποιηθεί το πρήξιμο

Κατά τη διάρκεια της ακτινοθεραπείας, μπορεί να συσσωρεύονται αέρια ή

υγρά στο έντερό σας και να προκληθεί πρήξιμο. Όταν τα έντερά σας είναι φουσκωμένα, μπορεί να διασταλούν στην περιοχή θεραπείας και να εκτεθούν σε ακτινοβολία. Έτσι μπορεί να προκληθούν παρενέργειες ή να επιδεινωθούν οι παρενέργειες σας.

Ακολουθήστε τις γενικές οδηγίες παρακάτω για να μειωθεί ο κίνδυνος να πρηξίματος κατά τη διάρκεια της ακτινοθεραπείας. Καλύτερα να ξεκινήσετε 2 με 3 ημέρες πριν από την προσομοίωσή σας και να συνεχίσετε μέχρι να τελειώσετε με την ακτινοθεραπεία σας.

- Μασάτε καλά το φαγητό σας.
- Περιορίσετε ή αποφύγετε τροφές που εκλύουν αέρια κατά την πέψη τους, όπως:
 - Σπαράγγια
 - Μπύρα
 - Μπρόκολο
 - Λαχανάκια Βρυξελλών
 - Λάχανο
 - Κουνουπίδι
 - Καλαμπόκι
 - Αποξηραμένα όσπρια, φασόλια και άλλα λαχανικά
 - Σκόρδο
 - Πράσα
 - Γάλα και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα με λακτόζη (εάν έχετε δυσανεξία στη λακτόζη)
 - Κρεμμύδια
 - Δαμάσκηνα
- Να αποφεύγετε ανθρακούχα ροφήματα, όπως σόδες και ανθρακούχο νερό.
- Περιορίστε ή αποφύγετε αλκοόλες σακχάρων, όπως ξυλιτόλη, σορβιτόλη και μαννιτόλη. Τα τρόφιμα χωρίς ζάχαρη συχνά έχουν αλκοόλες σακχάρου. Εάν δεν είστε σίγουροι, δείτε τη λίστα συστατικών στην ετικέτα Διατροφικών στοιχείων του τροφίμου.
- Επιλέγετε μαγειρεμένα λαχανικά αντί για ωμά λαχανικά.
- Ανάλογα με τα συμπτώματά σας, ο πάροχος υγειονομικής περίθαλψης

σας μπορεί να σας πει να τρώτε περισσότερες ή λιγότερες ίνες. Ακολουθήστε τις οδηγίες τους.

Εάν νιώθετε πρήξιμο, η τήρηση ημερολογίου φαγητών μπορεί να σας βοηθήσει να δείτε ποια φαγητά μπορεί να το προκαλούν. Σημειώνετε τα φαγητά και τα ποτά σας, την ώρα που τα παίρνετε και την ώρα που αρχίζετε να νιώθετε το φούσκωμα. Να έχετε το ημερολόγιο φαγητού σας στα ραντεβού σας. Ο πάροχος υγειονομικής περίθαλψης σας θα το χρησιμοποιήσει για να σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε το πρήξιμο.

Ένας κλινικός διαιτολόγος-διατροφολόγος σας μπορεί να σας μιλήσει για τη διατροφή σας και να σας βοηθήσει να σας δημιουργήσετε διατροφικό πρόγραμμα που να ταιριάζει στις ανάγκες σας. Εάν θα θέλατε να συναντήσετε έναν κλινικό διαιτολόγο-διατροφολόγο, ζητήστε από τον ραδιογκολόγο ή τον νοσηλευτή σας να σας παραπέμψει.

Ραντεβού για προσομοίωση

Θυμηθείτε να πάρετε 2 δισκία σιμεθικόνης (125 mg) το βράδυ πριν από το ραντεβού σας για προσομοίωση.

Την ημέρα της προσομοίωσής σας:

- Να παίρνετε 1 κουταλιά της σούπας σκόνης μεθυλο-κυτταρίνης όπως συνήθως.
- Χρησιμοποιήστε αλατούχο υποκλυσμό 3 ώρες πριν από την προσομοίωσή σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες στο κουτί.
- Να πάρετε 2 δισκία σιμεθικόνης (125 mg) περίπου 2 ώρες πριν από το ραντεβού σας.
- Παίρνετε τα συνήθη φάρμακά σας.

Κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης, θα μείνετε σε μία θέση για πολλή ώρα. Εάν νομίζετε ότι θα σας είναι δύσκολο, πάρτε ακεταμινοφαίνη (Tylenol®) ή το παυσίπονο που συνηθίζετε 1 ώρα πριν το ραντεβού σας.

Βγάλτε τις συσκευές από το δέρμα σας

Μπορεί να έχετε κάποια συσκευή επάνω στο δέρμα σας. Πριν από την προσομοίωση ή τη θεραπεία, οι κατασκευαστές των συσκευών προτείνουν να τις βγάλετε:

- Συνεχής παρακολούθηση γλυκόζης (CGM)
- Αντλία ινσουλίνης

Εάν χρησιμοποιείτε ένα από αυτά, ρωτήστε τον ραδιογκολόγο εάν χρειαστεί να τα βγάλετε. Εάν χρειαστεί, φροντίστε να φέρετε μία επιπλέον συσκευή για να τη βάλετε μετά την προσομοίωσή σας ή τη θεραπεία σας.

Ίσως να μην γνωρίζετε πώς να διαχειριστείτε το σάκχαρό σας όσο δεν φοράτε τη συσκευή σας. Εάν ισχύει κάτι τέτοιο, μιλήστε με τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψής σας που διαχειρίζεται τη θεραπεία του διαβήτη σας πριν από το ραντεβού σας.

Τι να περιμένετε όταν φτάσετε

Ένα μέλος της ομάδας ακτινοθεραπείας σας θα σας δει όταν φτάσετε. Οι ακτινοθεραπευτές σας θα σας χαιρετίσουν και θα φωτογραφίσουν το πρόσωπό σας. Αυτή η εικόνα θα χρησιμοποιηθεί για να σας ταυτοποιεί καθ' όλη τη διάρκεια της θεραπείας σας. Θα ανασκοπήσουν επίσης τι να περιμένετε κατά την προσομοίωση.

Εάν δεν έχετε υπογράψει ήδη κάποιο έντυπο συναίνεσης, ο ραδιογκολόγος σας θα το εξετάσει μαζί σας. Θα σας δώσουν χρόνο να κάνετε ερωτήσεις. Μόλις απαντηθούν οι ερωτήσεις σας, θα ζητήσουν την υπογραφή σας.

Οι ακτινοθεραπευτές σας μπορεί να σας ζητήσουν επίσης να πιείτε νερό ούτως ώστε η ουροδόχος κύστη σας να είναι γεμάτη πριν την προσομοίωση. Θα σας πουν πόσο να πιείτε. Το να έχετε μία άνετα πλήρη ουροδόχο κύστη και εκκενωμένο έντερο βοηθά να απομακρύνεται ο υγιής ιστός σας από τις δέσμες ακτινοβολίας. Έτσι θα μειωθεί ο κίνδυνος παρενεργειών.

Όταν έρθει η ώρα για την προσομοίωσή σας, θα βάλετε μία ρόμπα νοσοκομείου. Συνεχίστε να φοράτε παπούτσια.

Τι να περιμένετε κατά την προσομοίωσή σας

Μόλις είστε έτοιμος/η, οι ακτινοθεραπευτές σας θα σας βοηθήσουν να ξαπλώσετε στην πλάτη σας επάνω στην τράπεζα προσομοίωσης. Θα σας βοηθήσουν να πάρετε τη σωστή θέση για την προσομοίωσή σας.

Η τράπεζα θα έχει σεντόνι, αλλά είναι σκληρή και δεν έχει μαξιλάρια. Εάν δεν έχετε πάρει παυσίπονο και νομίζετε ότι μπορεί να το χρειαστείτε, ενημερώστε τους ακτινοθεραπευτές σας πριν ξεκινήσει η προσομοίωσή σας. Επίσης, στην αίθουσα έχει συνήθως κρύο. Εάν δεν νιώσετε άνετα κάποια στιγμή, ενημερώστε τους ακτινοθεραπευτές σας. Θα κάνουν ό,τι μπορούν ώστε να διασφαλίσουν ότι είστε άνετα και έχετε ιδιωτικότητα.

Καθ' όλη τη διάρκεια της προσομοίωσής σας, θα νιώθετε την τράπεζα να κινείται σε διάφορες θέσεις. Τα φώτα στο δωμάτιο θα αναβοσβήνουν. Θα δείτε επίσης κόκκινα ή πράσινα λείζερ σε κάθε τοίχο. Οι ακτινοθεραπευτές σας τα χρησιμοποιούν ως οδηγό όταν σας τοποθετούν στην τράπεζα. **Μην κοιτάζετε απευθείας στο λείζερ.** Εάν το κάνετε, μπορεί να τραυματίσετε τα μάτια σας.


Μην μετακινηθείτε από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η προσομοίωση. Είναι σημαντικό να παραμείνετε στην ίδια θέση. Εάν δεν νιώθετε άνετα ή εάν χρειαστείτε βοήθεια, ενημερώστε τους ακτινοθεραπευτές σας. Θα μπεινοβγαίνουν στο δωμάτιο, αλλά πάντα θα υπάρχει κάποιος που θα μπορεί να σας βλέπει και να σας ακούει.

Η προσομοίωσή σας θα διαρκέσει περίπου 2 ώρες αλλά μπορεί να χρειαστεί περισσότερος ή λιγότερος χρόνος ανάλογα με τη συγκεκριμένη θεραπεία σας. Οι ακτινοθεραπευτές σας μπορεί να βάλουν μουσική να παίζει για να περάσετε τον χρόνο σας. Θα ακούτε και τους ακτινοθεραπευτές σας να μιλούν μεταξύ τους όσο εργάζονται. Θα σας λένε τι κάνουν.

Απεικονιστικές σαρώσεις

Θα κάνετε απεικονιστικές σαρώσεις της περιοχής θεραπείας όσο είστε ξαπλωμένος/η στη θέση θεραπείας σας (βλ. Εικόνα 1). Η ομάδα περίθαλψής σας θα δει τους αναφορικούς δείκτες στον προστάτη σας σε αυτές τις

εικόνες. Οι απεικονιστικές σαρώσεις μπορεί να γίνουν σε μηχανήματα ακτινογραφιών που λέγεται προσομοιωτής ή σε αξονικό τομογράφο.



Εικόνα 1. Αξονικός τομογράφος (CT)

Οι σαρώσεις αυτές χρησιμοποιούνται μόνον για να χαρτογραφηθεί η θεραπεία σας. **Δεν χρησιμοποιούνται για διάγνωση ή για την εύρεση όγκων.** Εάν χρειαστείτε άλλη απεικόνιση, ο νοσηλευτής σας θα σας το εξηγήσει.

Οι σαρώσεις σας θα διαρκέσουν περίπου 45 λεπτά. Θα ακούτε το μηχανήματα να ανάβει και να σβήνει. Ακόμα κι αν ο ήχος μοιάζει δυνατός, οι ακτινοθεραπευτές σας θα μπορούν να σας ακούν εάν τους μιλάτε.

Μαγνητική τομογραφία (MRI)

Ο γιατρός σας μπορεί να παραγγείλει μία MRI την ημέρα της προσομοίωσης. Θα ξαπλώσετε σε μία επίπεδη τράπεζα με το καλούπι που έγινε κατά την προσομοίωση επάνω στην πύελό σας.

Δερματοστιξίες (tattoo)

Οι θεραπευτές σας θα χρησιμοποιούν μαρκαδόρους για να σχεδιάσουν επάνω στο δέρμα σας στην περιοχή θεραπείας. Κατόπιν, θα κάνουν περίπου

4 με 6 δερματοστιξίες χρησιμοποιώντας μία καθαρή βελόνα και μία σταγόνα μελανιού. Κάθε δερματοστιξία θα έχει την αίσθηση σαν τρύπημα με βελόνα. Οι δερματοστιξίες δεν θα είναι μεγαλύτερες από το κεφάλι μίας βελόνας.

Αφού γίνουν οι δερματοστιξίες, οι ακτινοθεραπευτές σας θα σας βγάλουν αρκετές φωτογραφίες στη θέση προσομοίωσης. Θα χρησιμοποιούν τις φωτογραφίες και τα τατουάζ για να σας τοποθετούν σωστά επάνω στην τράπεζα κάθε μέρα της θεραπείας σας.

Μπορείτε να ξεπλύνετε τα σημάδια του μαρκαδόρου μετά από την προσομοίωσή σας. **Τα τατουάζ είναι μόνιμα. Δεν θα ξεπλυθούν.** Εάν σας προβληματίζει ότι θα σας γίνουν τατουάζ στο πλαίσιο της ακτινοθεραπείας σας, μιλήστε στον ραδιογκολόγο σας.

Προγραμματίζοντας τις Θεραπείες IG-IMRT σας

Θα προγραμματίσετε τα ραντεβού θεραπείας σας πριν φύγετε από το ραντεβού προσομοίωσης σας. Οι ακτινοθεραπείες μπορούν να χορηγηθούν από Δευτέρα έως Παρασκευή. Θα λαμβάνετε θεραπείες για περίπου 5 εβδομάδες. Κάθε ραντεβού θεραπείας θα διαρκεί περίπου 30 με 60 λεπτά.

Είναι σημαντικό να προσέρχεστε κάθε φορά που έχετε προγραμματιστεί για θεραπεία. Η θεραπεία σας μπορεί να μην έχει εξίσου καλά αποτελέσματα εάν παραλείψετε ή χάσετε ραντεβού. Εάν δεν μπορείτε να έρθετε για θεραπεία για κάποιο λόγο, καλέστε στο ιατρείο του ραδιογκολόγου σας. Εάν χρειαστεί να αλλάξετε το πρόγραμμά σας για κάποιον λόγο, μιλήστε με τον ακτινοθεραπευτή σας.

Σχεδιασμός Θεραπείας IG-IMRT

Ανάμεσα στην προσομοίωσή σας και την πρώτη θεραπεία, ο ραδιογκολόγος σας θα συνεργαστεί με την ομάδα για να σχεδιάσει τη θεραπεία σας. Θα χρησιμοποιήσουν τις απεικονιστικές σαρώσεις προσομοίωσής σας για να προγραμματίσουν προσεκτικά και να ελέγξουν τις γωνίες και τα σχήματα των δεσμών ακτινοβολίας. Θα διαπιστώσουν επίσης τη δόση ακτινοβολίας που θα λάβετε. Αυτό μπορεί να διαρκέσει έως και 2 εβδομάδες.

Το σχέδιο θεραπείας βασίζεται στο σχήμα και το μέγεθος του σώματος σας τη στιγμή της προσομοίωσης. Προσπαθήστε να διατηρείτε το βάρος σας μεταξύ 2,25 έως 4,5 κιλά από το συνηθισμένο σας βάρος. Αυτό βοηθά να διασφαλιστεί ότι το πλάνο θεραπείας σας με ακτινοβολία παραμένει ακριβές.

Τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια της IG-IMRT στον προστάτη σας

Βιταμίνες και συμπληρώματα διατροφής κατά τη διάρκεια της ακτινοθεραπείας

Δεν υπάρχει πρόβλημα να παίρνετε πολυβιταμίνη κατά την ακτινοθεραπεία σας. Μην παίρνετε περισσότερα από το συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη βιταμινών (RDA) ή μεταλλικών στοιχείων.

Μην παίρνετε άλλα συμπληρώματα διατροφής χωρίς να μιλήσετε με κάποιο μέλος της ομάδας περίθαλψής σας. Οι βιταμίνες, τα μεταλλικά στοιχεία και τα φυτικά ή βοτανικά (βασισμένα σε βότανα) συμπληρώματα αποτελούν παραδείγματα συμπληρωμάτων διατροφής.

Προετοιμασία εντέρου

- Συνεχίστε να παίρνετε 1 κουταλιά της σούπας σκόνης μεθυλοκυτταρίνης καθημερινά μέχρι να τελειώσετε την IG-IMRT σας.
- Να παίρνετε 2 δισκία σιμεθικόνης (125 mg) το βράδυ πριν από καθένα από τα ραντεβού θεραπείας σας.
- Να παίρνετε 2 δισκία σιμεθικόνης (125 mg) περίπου 2 ώρες πριν καθένα από τα ραντεβού θεραπείας σας.

Εάν η ομάδα περίθαλψής σας σας δώσει άλλες οδηγίες, ακολουθήστε εκείνες, αντί αυτών.

Ραντεβού Θεραπείας

Παρουσιαστείτε στην υποδοχή και καθίστε στον χώρο αναμονής. Όταν

είναι έτοιμοι οι ακτινοθεραπευτές σας, ένα μέλος του προσωπικού θα σας οδηγήσει στο αποδυτήριο. Θα σας δώσει μία νοσοκομειακή ρόμπα για να τη βάλετε. Συνεχίστε να φοράτε παπούτσια.

Πολλοί θα πρέπει να έχουν γεμάτη ουροδόχο κύστη για τη θεραπεία τους. Εάν πρέπει κι εσείς, ο ακτινοθεραπευτής σας θα σας πει πόσο νερό πρέπει να πιείτε και πότε να αρχίσετε να το πίνετε.

Διαδικασία εγκατάστασης

Θα υποβληθείτε σε μία διαδικασία διάταξης πριν από την πρώτη θεραπεία σας. Κάποιοι υποβάλλονται σε διαδικασία διάταξης και την πρώτη θεραπεία τους την ίδια ημέρα. Εάν θα συμβεί και σε εσάς, το ραντεβού σας θα διαρκέσει λίγο παραπάνω απ' ό,τι συνήθως. Άλλοι υποβάλλονται στη διαδικασία διάταξης και την πρώτη θεραπεία τους σε διαφορετικές ημέρες. Η ομάδα περίθαλψης θα σας πει τι να περιμένετε.

Για τη διαδικασία διάταξής σας, οι ακτινοθεραπευτές σας θα σας πάνε στην αίθουσα όπου θα λάβετε τις θεραπείες σας. Θα σας βοηθήσουν να ξαπλώσετε επάνω στην τράπεζα θεραπείας και να πάρετε τη θέση σας. Θα είναι η ίδια θέση με αυτή κατά την προσομοίωσή σας.


Μόλις βρεθείτε στη θέση σας, θα υποβληθείτε σε ειδικές απεικονιστικές σαρώσεις (ακτινογραφίες ή αξονικές σαρώσεις) που λέγονται ακτινικές πλάκες. Βγαίνουν για να διασφαλιστεί ότι η θέση σας και ο χώρος θεραπείας είναι σωστές. Οι δείκτες αναφοράς στον προστάτη σας θα εμφανίζονται στις ακτινικές πλάκες και θα μας βοηθήσουν να σας τοποθετήσουμε σωστά.

Οι ακτινικές πλάκες θα επαναλαμβάνονται καθ' όλη τη διάρκεια της θεραπείας σας. **Δεν χρησιμοποιούνται για να δούμε πως ανταποκρίνεται στη θεραπεία ο όγκος σας.**

Κατά τις Θεραπείες IG-IMRT σας

Οι ακτινοθεραπευτές σας θα σας φέρουν στην αίθουσα θεραπείας. Θα σας βοηθήσουν να ξαπλώσετε επάνω στην τράπεζα και να πάρετε τη θέση σας (δείτε το σχέδιο 2). Θα είναι η ίδια θέση με αυτή κατά την προσομοίωσή σας

και στη διαδικασία διάταξης.



Εικόνα 2. Κατά τη θεραπεία σας

Αφού βρεθείτε στη σωστή θέση, οι ακτινοθεραπευτές σας θα βγουν από το δωμάτιο, θα κλείσουν την πόρτα και θα ξεκινήσουν τη θεραπεία σας. Θα βγάλουν ακτινικές πλάκες για να βεβαιωθούν ότι είστε στη σωστή θέση. Ο ραδιογκολόγος σας μπορεί να τις χρησιμοποιήσει για να προσαρμόσετε τη θεραπεία σας.

Δεν θα δείτε ούτε θα νιώσετε την ακτινοβολία. Μπορεί να ακούσετε το μηχάνημα καθώς μετακινείται γύρω σας και ενεργοποιείται και απενεργοποιείται.

Θα βρίσκεστε στην αίθουσα θεραπείας για 15 με 45 λεπτά, ανάλογα με το σχέδιο θεραπείας σας. Ο περισσότερος χρόνος θα περάσει με την τοποθέτηση του σώματός σας στην σωστή θέση. Η θεραπεία IG-IMRT διαρκεί μόνον περίπου 10 με 15 λεπτά.

Αναπνέετε κανονικά κατά τη θεραπεία σας αλλά μην κινείστε. Εάν δεν νιώθετε άνετα και χρειάζεστε βοήθεια, ενημερώστε τους ακτινοθεραπευτές σας. Θα είναι σε θέση να σας δουν και να σας ακούσουν. Μπορεί να σβήσουν το μηχάνημα και να έρθουν μέσα για να σας δουν ανά πάσα στιγμή, εάν χρειαστεί.

Δεν θα είστε ραδιενεργοί κατά τη διάρκεια ή μετά από τη θεραπεία. Είναι ασφαλές να βρίσκεστε με άλλα άτομα.

Επισκέψεις ελέγχου κατάστασης

Ο ραδιογκολόγος σας και ο νοσηλευτής σας θα σας βλέπουν κάθε εβδομάδα. Θα βλέπουν πως πάει η θεραπεία σας, θα ρωτούν για τυχόν παρενέργειες που έχετε και θα απαντούν στις ερωτήσεις σας. Λέγεται επίσκεψη ελέγχου κατάστασης. Προγραμματίστε να είστε στο ραντεβού σας για περίπου 1 επιπλέον ώρα τις ημέρες αυτές.

Η επίσκεψη ελέγχου κατάστασής σας θα γίνεται πριν ή μετά από τις θεραπείες σας κάθε _____.

Εάν χρειαστεί να μιλήσετε με τον ραδιογκολόγο σας ή τον νοσηλευτή σας ανάμεσα στις επισκέψεις ελέγχου κατάστασης, καλέστε το γραφείο ραδιογκολόγου σας. Μπορείτε, επίσης, να ζητήσετε από κάποιο άλλο μέλος της ομάδας περίθαλψής σας να επικοινωνήσει μαζί του/της όταν προσέρχεστε για θεραπεία.

Παρενέργειες της IG-IMRT στον προστάτη σας

Ορισμένοι αναπτύσσουν παρενέργειες από την ακτινοβολία. Σε αυτή την ενότητα αναγράφονται οι πιο συχνές παρενέργειες της IG-IMRT στον προστάτη.

Ενδέχεται να έχετε όλες, ορισμένες, ή καμία από αυτές τις παρενέργειες. Η εμπειρία όλων είναι διαφορετική. Ο πάροχος υγειονομικής περίθαλψής σας θα σας μιλήσει για το τι να περιμένετε με βάση το ιατρικό ιστορικό και το σχέδιο θεραπείας σας.

Είναι σημαντικό να μας πείτε εάν έχετε παρενέργειες και να μας ενημερώνετε για το τι κάνετε. Μπορούμε να σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες και να σας βοηθήσουμε να τις διαχειριστείτε.

Αλλαγές στην ούρηση

Περίπου 2 εβδομάδες μετά από την πρώτη θεραπεία σας, μπορεί να:

- Αντιμετωπίζετε δυσκολίες όταν ξεκινάτε να ουρείτε.
- Χρειάζεστε να ουρήσετε πιο συχνά απ' ό,τι συνήθως.
- Χρειάζεστε να ουρήσετε το βράδυ πιο συχνά απ' ό,τι συνήθως.
- Έχετε ξαφνική ανάγκη ούρησης.
- Έχετε διαρροή ούρων.
- Νιώθετε καύσο κατά την ούρηση.

Ενημερώστε τον ραδιογκολόγο ή τον νοσηλευτή σας εάν παρατηρήσετε κάποιες αλλαγές στην ούρηση. Μπορεί να προτείνουν μία αλλαγή στη διατροφή σας ή να συνταγογραφήσουν φάρμακα που μπορεί να βοηθήσουν. Μπορείτε επίσης να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες.

- Πίνετε 6 με 8 κούπες νερό (225 γραμμαρίων) καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.
- Αποφύγετε να πίνετε μετά τις 8μ.μ.
- Αποφύγετε τρόφιμα και ροφήματα που μπορεί να ερεθίσουν την ουροδόχο κύστη σας, όπως:
 - Καφεΐνη, όπως τσάι, καφέ και αναψυκτικά.
 - Αλκοόλ.
 - Όξινα τρόφιμα και ροφήματα, όπως ντομάτες, εσπεριδοειδή και χυμοί και ανθρακούχα (αναψυκτικά) ροφήματα.
 - Πικάντικα φαγητά, ιδιαιτέρως εάν νιώθετε καύσο όταν ουρείτε.
- Κάνετε ασκήσεις μυών πυελικού εδάφους (Kegel). Διαβάστε το *Pelvic*

Floor Muscle (Kegel) Exercises for Males (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/pelvic-floor-muscle-kegel-exercises-males) για να μάθετε πως. Ένα μέλος της ομάδας περίθαλψης σας θα σας πει πόσο πολλές να κάνετε και πόσο συχνά να τις κάνετε.

Για να μάθετε περισσότερα για τις αλλαγές ουροποιητικού, διαβάστε το *Improving Your Urinary Continence* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/improving-your-urinary-continence).

Αλλαγές στην εντερική λειτουργία

Περίπου 2 εβδομάδες μετά από την πρώτη θεραπεία σας, μπορεί να:

- Έχετε κινήσεις εντέρου (κόπρανα) πιο συχνά από ό,τι συνήθως.
- Έχετε πιο μαλακά κόπρανα από ό,τι συνήθως.
- Νιώθετε ενόχληση στο ορθό σας.
- Έχετε βλεννική έκκριση από τον πρωκτό σας. Ο πρωκτός σας είναι το άνοιγμα του ορθού σας όπου τα κόπρανα βγαίνουν από το σώμα σας.
- Έχετε μία μικρή ποσότητα αιμορραγίας από το ορθό σας. Για παράδειγμα, μπορεί να δείτε ανοιχτό κόκκινο αίμα στο χαρτί υγιείας ή στα κόπρανά σας.
- Έχετε περισσότερα αέρια απ' ό,τι συνήθως.
- Νοιώθετε σαν πρέπει να έχετε κινήσεις εντέρου πιο επείγοντως απ' ό,τι συνήθως.

Εάν έχετε αιμορροΐδες, η ακτινοθεραπεία μπορεί επίσης να επιδεινώσει τα συμπτώματα στις αιμορροΐδες σας.

Τα συμπτώματα αυτά είναι συνήθως ήπια.

Εάν έχετε κάποια από αυτές τις παρενέργειες, ενημερώστε τον νοσηλευτή για την ακτινοβολία σας. Μπορούν να σας πουν σχετικά με το πως μπορείτε να αλλάξετε τη διατροφή σας για να τις αντιμετωπίσετε. Εάν εξακολουθείτε να μην νιώθετε άνετα, ενημερώστε τον ραδιογκολόγο ή τον νοσηλευτή σας. Ο ραδιογκολόγος σας μπορεί να συνταγογραφήσει φάρμακα

για να σας βοηθήσει.

Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία

Μπορείτε να είστε σεξουαλικά ενεργοί κατά την ακτινοθεραπεία, εκτός κι αν ο ραδιογκολόγος σας σάς δώσει άλλες οδηγίες. Δεν θα είστε ραδιενεργός/ή ούτε θα μεταδίδετε ακτινοβολία σε κάποιον άλλο. Είναι ασφαλές να είστε σε στενή επαφή με άλλους.

Μπορεί να νιώθετε άβολα ή να νιώθετε αίσθηση καύσου κατά την εκσπερμάτιση. Για τους περισσότερους, αυτό φεύγει 1 με 2 μήνες αφού τελειώσει η ακτινοθεραπεία.

Εάν είστε σεξουαλικά ενεργός/η με κάποια που μπορεί να μείνει έγκυος, είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιείτε αντισύλληψη κατά τη διάρκεια της θεραπείας σας και για 1 χρόνο μετά τη θεραπεία σας. Κατά την ακτινοθεραπεία σας, το σπέρμα σας μπορεί να υποστεί ζημία από την ακτινοβολία. Εάν συλλάβετε ένα μωρό με αυτό το σπέρμα, το μωρό που μπορεί να έχει συγγενείς ανωμαλίες. Η χρήση της αντισύλληψης βοηθά στην πρόληψη αυτών.

Για να μάθετε περισσότερα για την σεξουαλική υγεία κατά την αντικαρκινική θεραπεία, διαβάστε το *Sex and Your Cancer Treatment* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/sex-cancer-treatment). Η Αμερικανική Καρκινική Ένωση έχει επίσης πηγές για ζητήματα σεξουαλικής υγείας κατά την αντικαρκινική θεραπεία. Για τους άνδρες λέγεται *Σεξουαλικότητα και Ενήλικες άνδρες με καρκίνο*. Μπορείτε να την αναζητήσετε στη διεύθυνση www.cancer.org ή να καλέσετε το 800-227-2345 για κάποιο αντίτυπο.

Πρόγραμμα Ανδρικής και Αναπαραγωγικής Σεξουαλικής Ιατρικής

Το [Male Sexual and Reproductive Medicine Program](#) (Πρόγραμμα ανδρικής σεξουαλικής και αναπαραγωγικής ιατρικής) της MSK βοηθά ανθρώπους να αντιμετωπίσουν τη νόσο τους και τον αντίκτυπο της θεραπείας στη σεξουαλική υγεία τους. Μπορείτε να συναντήσετε έναν ειδικό πριν, κατά τη

διάρκεια ή μετά τη θεραπεία σας. Μπορούμε να σας δώσουμε ένα παραπεμπτικό ή μπορείτε να καλέσετε στο 646-888-6024 για να κλείσετε ένα ραντεβού.

Κόπωση

Η κόπωση είναι να νιώθετε πολύ κουρασμένος(η) ή αδύναμος(η). Όταν νιώθετε κόπωση, μπορεί να μη θέλετε να κάνετε πράγματα. Μπορεί να δυσκολεύεστε να εστιάσετε, να νιώθετε ότι αργείτε ή ότι έχετε λιγότερη ενέργεια απ' ό,τι συνήθως.

Μπορεί να αρχίσετε να νιώθετε κόπωση μετά από 2 με 3 εβδομάδες θεραπείας. Μπορεί να κυμαίνεται από ήπια (όχι άσχημα) έως βαριά (πολύ άσχημα). Μπορεί να είναι χειρότερη κάποιες ώρες της ημέρας. Η κόπωση μπορεί να διαρκεί από 6 εβδομάδες έως 12 μήνες μετά την τελευταία θεραπεία σας.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι που μπορεί να νιώθετε κόπωση κατά την ακτινοθεραπεία σας. Σε αυτούς περιλαμβάνονται:

- Οι επιπτώσεις της ακτινοβολίας στο σώμα σας.
- Η μετακίνηση προς και από τα ραντεβού της θεραπείας σας.
- Να μην κοιμάστε το βράδυ ώστε να ξεκουραστείτε.
- Να μην τρώτε αρκετές πρωτεΐνες και θερμίδες.
- Να εμφανίσετε πόνο ή άλλα συμπτώματα.
- Να νιώθετε άγχος (νευρικότητα) ή κατάθλιψη (στεναχώρια).
- Παρενέργειες ορισμένων φαρμάκων.

Τρόποι αντιμετώπισης κόπωσης

- Εάν δουλεύετε και νιώθετε καλά, δεν υπάρχει πρόβλημα να συνεχίσετε να εργάζεστε. Όμως, εάν εργάζεστε λιγότερο μπορεί να έχετε περισσότερη ενέργεια.
- Προγραμματίστε τις καθημερινές σας δραστηριότητες. Επιλέξτε αυτά

που πρέπει ή που θέλετε πολύ να κάνετε. Κάντε τα όταν έχετε την περισσότερη ενέργεια. Για παράδειγμα, μπορεί να επιλέξετε να πηγαίνετε στη δουλειά αλλά να μην κάνετε δουλειές στο σπίτι. Μπορεί να επιλέξετε να δείτε το παιδί σας σε μία εξωσχολική εκδήλωση και να μην βγείτε για φαγητό.

- Προγραμματίστε να ξεκουράζεστε ή να κοιμάστε για λίγο (10 με 15 λεπτά) κατά τη διάρκεια της ημέρας, ιδιαιτέρως όταν νιώθετε πιο κουρασμένοι.
- Προσπαθήστε να κοιμάστε για τουλάχιστον 8 ώρες κάθε βράδυ. Μπορεί να περισσότερο από όσο χρειαζόσασταν πριν ξεκινήσετε την ακτινοθεραπεία. Μπορεί να θεωρήσετε χρήσιμο να:
 - Πηγαίνετε για ύπνο πιο νωρίς και να ξυπνάτε πιο αργά.
 - Είστε δραστήριοι κατά τη διάρκεια της ημέρας. Για παράδειγμα, εάν μπορείτε να ασκείστε, θα μπορούσατε να πάτε για μια βόλτα ή να κάνετε γιόγκα.
 - Χαλαρώνετε πριν πάτε στο κρεβάτι. Για παράδειγμα, να διαβάζετε ένα βιβλίο, να κάνετε ένα παζλ, να ακούγατε μουσική ή να κάνετε ένα άλλο χαλαρωτικό χόμπι.
- Ζητάτε από την οικογένεια και τους φίλους σας να σας βοηθήσουν με δουλειές στο σπίτι και με θελήματα. Δείτε μήπως η ασφαλιστική εταιρεία υγείας σας καλύπτει υπηρεσίες κατ' οίκον φροντίδας.
- Ενδέχεται να έχετε περισσότερη ενέργεια όταν ασκείστε. Ρωτήστε τον ραδιογκολόγο σας εάν μπορείτε να κάνετε ελαφριά γυμναστική, όπως το περπάτημα, το ποδήλατο, οι διατάσεις ή η γιόγκα. Διαβάστε το *\Managing Cancer-Related Fatigue with Exercise* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/managing-cancer-related-fatigue-exercise) για να μάθετε περισσότερα.
- Καταναλώνετε τροφές που έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και θερμίδες. Διαβάστε το *\Managing Cancer-Related Fatigue with Exercise* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/managing-cancer-related-fatigue-exercise) για να μάθετε περισσότερα.

Κάποια πράγματα μπορούν να επιδεινώσουν την κόπωσή σας.

Παραδείγματα είναι τα εξής:

- Πόνος
- Ναυτία (αίσθηση σαν πρόκειται να κάνετε εμετό)
- Διάρροια (χαλαρά ή υδαρή κόπρανα)
- Προβλήματα ύπνου
- Αίσθηση κατάθλιψης ή άγχους

Εάν έχετε κάποιο από αυτά ή κάποια άλλα συμπτώματα ή παρενέργειες, ζητήστε βοήθεια από τον ραδιογκολόγο σας ή τον νοσηλευτή σας.

Συναισθηματική υγεία

Η διάγνωση και η θεραπεία του καρκίνου μπορεί να είναι πολύ στρεσογόνα και αφόρητη. Ίσως νιώθετε:

- Αγχωμένος(η) ή νευρικός(ή)
- Φοβισμένοι
- Μόνοι
- Οργισμένοι
- Σε κατάθλιψη
- Αβοήθητοι
- Εξοργισμένοι
- Μουδιασμένοι
- Αβέβαιος(η)
- Ανήσυχτοι

Ίσως ανησυχείτε και πως θα πείτε στον εργοδότη σας ότι έχετε καρκίνο ή να πληρώσει τα ιατρικά σας έξοδα. Ίσως ανησυχείτε για το πώς μπορεί να αλλάξουν οι οικογενειακές σας σχέσεις ή ότι θα επανεμφανιστεί ο καρκίνος. Ίσως ανησυχείτε για το πώς θα επηρεαστεί το σώμα σας από την αντικαρκινική θεραπεία ή για το αν θα είστε ακόμα σεξουαλικά ελκυστικός(ή).

Είναι φυσιολογικό να ανησυχείτε για όλα αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά τα συναισθήματα είναι φυσιολογικά όταν εσείς ή κάποιος που αγαπάτε πάσχει από σοβαρή ασθένεια. Είμαστε εδώ για να σας στηρίξουμε.

Τρόποι για να αντιμετωπίσετε τα συναισθήματά σας

Μιλήστε με άλλους. Όταν οι άνθρωποι προσπαθούν να προστατεύουν ο ένας τον άλλο κρύβοντας τα συναισθήματά τους, μπορεί να νιώθουν πολύ μόνοι. Όταν μιλάτε, μπορείτε να βοηθήσετε τους άλλους γύρω σας να μάθουν τι σκέφτεστε. Ίσως βοηθά να μιλάτε για τα συναισθήματά σας με κάποιον που εμπιστεύεστε. Για παράδειγμα, μπορείτε να μιλήσετε με τον/την σύζυγο ή σύντροφό σας, κάποιο κοντινό φίλο ή μέλος της οικογένειάς σας. Μπορείτε να μιλήσετε και με κάποιον ιερέα (πνευματικό σύμβουλο), νοσηλεύτη, κοινωνικό λειτουργό ή ψυχολόγο.

Μπείτε σε μία ομάδα στήριξης. Η συνάντηση με άλλους καρκινοπαθείς θα σας δώσει την ευκαιρία να μιλήσετε για τα συναισθήματά σας και να μάθετε από άλλους. Μπορείτε να μάθετε πώς τα βγάζουν οι άλλοι πέρα με τον καρκίνο και τη θεραπεία τους και θα θυμηθείτε ότι δεν είστε μόνοι.

Γνωρίζουμε ότι όλες οι διαγνώσεις του καρκίνου και όλοι οι καρκινοπαθείς δεν είναι οι ίδιοι. Προσφέρουμε ομάδες στήριξης για άτομα που έχουν παρόμοιες διαγνώσεις ή ταυτότητες. Για παράδειγμα, μπορείτε να συμμετάσχετε σε μία ομάδα στήριξης για άτομα με καρκίνο του μαστού για άτομα LGBTQ+ με καρκίνο. Για να μάθετε για τις ομάδες στήριξης της MSK, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.msk.org/vp. Μπορείτε να μιλήσετε και με τον ακτινοθεραπευτή ογκολόγο σας, τον νοσηλεύτη ή τον κοινωνικό λειτουργό σας.

Δοκιμάστε να ξεκουραστείτε και να κάνετε διαλογισμό. Αυτού του είδους οι δραστηριότητες μπορεί να σας κάνουν να νιώθετε χαλαροί και ήρεμοι. Ίσως να προσπαθήσετε να σκεφτείτε ότι βρίσκεστε σε ένα αγαπημένο μέρος. Ενώ κάνετε κάτι τέτοιο, αναπνέετε αργά. Δίνετε σημασία σε κάθε ανάσα ή ακούτε χαλαρωτική μουσική ή ήχους. Για ορισμένους, η προσευχή είναι ένας άλλος τρόπος διαλογισμού. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.msk.org/meditations για να βρείτε καθοδηγούμενο διαλογισμό που παρέχεται από τους παρόχους Ολιστικής ιατρικής μας.

Άσκηση. Πολλοί θεωρούν ότι η ελαφρά κίνηση, όπως το βάδισμα, το ποδήλατο, η γιόγκα ή αερόμπικ στο νερό τους κάνει να νιώθουν καλύτερα.

Μιλήστε με τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψής σας σχετικά με τους τύπους άσκησης που μπορείτε να κάνετε.

Όλοι έχουμε τον τρόπο μας να αντιμετωπίζουμε δύσκολες καταστάσεις. Συχνά χρησιμοποιούμε ό,τι είχε αποτελέσματα για εμάς στο παρελθόν. Όμως μερικές φορές, δεν αρκεί. Σας ενθαρρύνουμε να μιλήσετε με τον γιατρό σας, τον νοσηλευτή ή τον κοινωνικό λειτουργό για τους προβληματισμούς σας.

Μετά από την IG-IMRT στον προστάτη σας

Εάν είστε σεξουαλικά ενεργός/η με κάποια που μπορεί να μείνει έγκυος, να θυμάστε να χρησιμοποιείτε αντισύλληψη για 1 χρόνο αφού τελειώσει η ακτινοθεραπεία.

Ραντεβού παρακολούθησης

Είναι σημαντικό να έρχεστε σε όλα τα ραντεβού παρακολούθησής σας με τον ραδιογκολόγο σας. Κατά τη διάρκεια των ραντεβού αυτών, θα ελέγχουν πώς αναρρώνετε μετά την ακτινοθεραπεία σας.

Σημειώστε τις ερωτήσεις και τους προβληματισμούς σας πριν τα ραντεβού παρακολούθησης σας. Και να τις φέρνετε μαζί με τη λίστα με όλα τα φάρμακα που έχετε πάρει. Μπορείτε επίσης να καλέσετε τον ραδιογκολόγο σας ή τον νοσηλευτή σας ανά πάσα στιγμή αφού τελειώσει η ακτινοθεραπεία σας ή μεταξύ των ραντεβού παρακολούθησης.

Βιταμίνες και συμπληρώματα διατροφής μετά την ακτινοθεραπεία

- Ενδέχεται να λαμβάνετε άλλες αντικαρκινικές θεραπείες μαζί με την ακτινοθεραπεία σας. Εάν λαμβάνετε, ρωτήστε τον γιατρό που διαχειρίζεται τη θεραπεία αυτή όταν είναι ασφαλές να αρχίσετε να παίρνετε και πάλι συμπληρώματα διατροφής. Δεν είναι ασφαλές να παίρνετε ορισμένα συμπληρώματα διατροφής πριν από την επέμβαση ή

κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας.

- Εάν δεν λαμβάνετε άλλες αντικαρκινικές θεραπείες, μπορείτε να αρχίσετε να παίρνετε συμπληρώματα διατροφής και πάλι 1 μήνα μετά από την τελευταία σας θεραπεία με ακτινοβολία.

Εάν θέλετε να μιλήσετε με έναν κλινικό διαιτολόγο/διατροφολόγο σχετικά με τη διατροφή ή τα συμπληρώματά σας, πείτε το στον νοσηλευτή ακτινοθεραπείας σας.

Αλλαγές στο ουροποιητικό και το έντερο

Κάποιοι εμφανίζουν παρενέργειες 4 μήνες ή περισσότερο μετά τη θεραπεία. Μπορεί να είναι παρόμοια με αυτά που είχατε κατά τη θεραπεία. Υπάρχει μία πολύ μικρή πιθανότητα να εμφανίσετε άλλες παρενέργειες. Για παράδειγμα:

- Το άνοιγμα της ουροδόχου κύστης σας μπορεί να γίνει πιο στενό.
- Μπορεί να έχετε αίμα στα ούρα σας.
- Μπορεί να έχετε αιμορραγία από το ορθό σας.

Αυτές οι παρενέργειες είναι σπάνιες. Μπορεί να εμφανίζονται και να χάνονται με την πάροδο του χρόνου. Ή μπορεί να είναι επίμονα και χρόνια. Η ομάδα περίθαλψής σας θα σας βοηθήσει να τα αντιμετωπίσετε.

Ακόμα κι αν δεν εμφανίσετε όψιμες παρενέργειες, να θυμάστε ότι η ακτινοθεραπεία σας επηρέασε τους ιστούς στην ουροδόχο κύστη και το ορθό σας. Καλέστε τον ραδιογκολόγο σας, εάν:

- Έχετε νέα συμπτώματα στην ουρήθρα, την ουροδόχο κύστη ή το έντερο.
- Πρέπει να υποβληθείτε σε κολonosκόπηση. Αποφύγετε να υποβληθείτε σε κολonosκόπηση για τον πρώτο χρόνο μετά τη θεραπεία.
- Χρειάζεστε κάποιο είδος διαδικασίας στο ουροποιητικό ή στο ορθό.

Σεξουαλικές αλλαγές

Κάποιοι αναπτύσσουν σεξουαλικές αλλαγές αφού τελειώσουν τη θεραπεία.

Για παράδειγμα:

- Ενδεχομένως να είναι πιο δύσκολο ή να μην είναι δυνατό να προκύψει ή να διατηρηθεί στύση. Λέγεται στυτική δυσλειτουργία (ED).
- Οι οργασμοί σας μπορεί να είναι διαφορετικοί.
- Όταν εκσπερματίζετε, η ποσότητα ή το πάχος του σπέρματός σας μπορεί να είναι διαφορετικά.

Αυτές οι αλλαγές μπορεί να συμβούν πολλούς μήνες ή ακόμα και χρόνια μετά την ακτινοθεραπεία. Αν παρατηρήσετε κάποιο από τα παραπάνω, ενημερώστε τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψής σας. Μπορούν να σας δώσουν παραπομπή για έναν πάροχο υγειονομικής περίθαλψης που θεραπεύει τα προβλήματα αυτά.

Υπηρεσίες υποστήριξης MSK

Counseling Center (Κέντρο Συμβουλευτικής)

www.msk.org/counseling

646-888-4

Πολλοί θεωρούν ότι η συμβουλευτική τους βοηθά. Το συμβουλευτικό κέντρο μας προσφέρει συμβουλευτική σε άτομα, ζευγάρια, οικογένειες και ομάδες. Επίσης συνταγογραφούμε φάρμακα για να βοηθήσουμε εάν νιώθετε άγχος ή κατάθλιψη. Ζητήστε από ένα μέλος της ομάδας περίθαλψής σας να σας παραπέμψει ή καλέστε τον παραπάνω αριθμό για να κλείσετε ραντεβού.

Integrative Medicine Service (Υπηρεσία Ολιστικής ιατρικής)

www.msk.org/integrativemedicine

646-608-8550

Η Υπηρεσία Ολιστικής ιατρικής που διαθέτουμε προσφέρει πολλές υπηρεσίες που συμπληρώνουν (συνοδεύουν) την παραδοσιακή ιατρική περίθαλψη, και συμπεριλαμβάνονται θεραπεία με μουσική, ψυχική/σωματική θεραπεία, χορό και θεραπεία μέσω κίνησης, γιόγκα και θεραπεία αφής. Καλέστε το 646-449-1010 για να κλείσετε ένα ραντεβού για αυτές τις υπηρεσίες.

Μπορείτε να προγραμματίσετε επίσης μια συνάντηση με έναν πάροχο υγειονομικής περίθαλψης στην Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Ιατρικής. Θα συνεργαστούν μαζί σας για να κάνετε ένα σχέδιο για τη δημιουργία ενός υγιεινού τρόπου ζωής και τη διαχείριση των παρενεργειών. Καλέστε το 646-608-8550 για να κλείσουμε ένα ραντεβού συμβουλευτικής.

Male Sexual & Reproductive Medicine Program (Πρόγραμμα Ανδρικής Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής ιατρικής)

646-888-6024

Το πρόγραμμα αυτό βοηθά άντρες ασθενείς που αντιμετωπίζουν σχετικές με τον καρκίνο δυσκολίες στην σεξουαλική τους υγεία, συμπεριλαμβανομένης της στυτικής δυσλειτουργίας.

Nutrition Services (Υπηρεσία Διατροφής)

www.msk.org/nutrition

212-639-7312

Η Nutrition Service μας προσφέρει συμβουλευτική με έναν από τους κλινικούς διαιτολόγους-διατροφολόγους μας. Ο κλινικός διαιτολόγος-διατροφολόγος σας θα μιλήσει μαζί σας για τις διατροφικές σας συνήθειες. Μπορεί επίσης να δώσει συμβουλές για το τι να τρώτε κατά τη διάρκεια και μετά τη θεραπεία. Ζητήστε από ένα μέλος της ομάδας περίθαλψής σας να σας παραπέμψει ή καλέστε τον παραπάνω αριθμό για να κλείσετε ραντεβού.

Rehabilitation Services (Υπηρεσίες αποκατάστασης)

www.msk.org/rehabilitation

Ο καρκίνος και οι αντικαρκινικές θεραπείες μπορούν να εξασθενίσουν το σώμα σας ή να το κάνουν άκαμπτο ή σφιγμένο. Κάποιες μπορούν να προκαλέσουν και λεμφοίδημα (οίδημα). Οι φυσιοθεραπευτές (γιατροί αποκατάστασης), εργοθεραπευτές και άλλοι πάροχοι σωματικής φροντίδας μας μπορούν να σας βοηθήσουν να επιστρέψετε στις συνηθισμένες σας δραστηριότητες.

- **Οι γιατροί αποκατάστασης** κάνουν διάγνωση και θεραπεύουν προβλήματα που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποία κινείστε και κάνετε δραστηριότητες. Μπορείτε να σχεδιάσετε και να συντονίσετε το

πρόγραμμα θεραπείας αποκατάστασής σας, είτε στην MSK είτε σε κάποιο άλλο μέρος που είναι πιο κοντά στο σπίτι σας. Για να μάθετε περισσότερα, καλέστε το τμήμα Ιατρικής Αποκατάστασης (Φυσιοθεραπείας) στο 646-888-1929.

- Μπορεί να σας βοηθήσει ένας **εργοθεραπευτής** εάν δυσκολεύεστε με συνηθισμένες καθημερινές δραστηριότητες. Για παράδειγμα, μπορεί να προτείνουν εργαλεία για να γίνουν πιο εύκολες οι καθημερινές εργασίες. Ένας **πάροχος σωματικής φροντίδας** μπορεί να σας μάθει ασκήσεις με τις οποίες θα μπορέσετε να χτίσετε τη δύναμη και την ευλυγισία σας. Για να μάθετε περισσότερα, καλέστε το τμήμα Θεραπείας αποκατάστασης στο 646-888-1900.

Στοιχεία επικοινωνίας

Εάν έχετε απορίες ή προβληματισμούς, μιλήστε με ένα μέλος της ομάδας ακτινοθεραπείας σας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους από Δευτέρα έως Παρασκευή από 9 π.μ. έως 5 μ.μ. σε αυτούς τους αριθμούς.

Ραδιογκολόγος: _____

Αριθμός τηλεφώνου: _____

Νοσηλεύτης ακτινολογικού: _____

Αριθμός τηλεφώνου: _____

Μετά τις 5 μ.μ., κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου και σε αργίες, καλέστε το 212-639-2000. Ζητήστε τον ραδιογκολόγο που είναι σε βάρδια.

Ερωτήσεις για τον ακτινολόγο-ογκολόγο σας

Πριν το ραντεβού σας, είναι χρήσιμο να σημειώσετε τις ερωτήσεις που

θέλετε να κάνετε. Παρακάτω υπάρχουν παραδείγματα. Σημειώστε τις απαντήσεις κατά τη διάρκεια του ραντεβού σας ούτως ώστε να μπορείτε να εξετάσετε αργότερα.

Τι είδους ακτινοθεραπεία θα λάβετε;

Πόσες ακτινοθεραπείες θα λάβω;

Τι παρενέργειες θα πρέπει να αναμένω κατά την ακτινοθεραπεία μου;

Οι παρενέργειες αυτές θα φύγουν αφού τελειώσω την ακτινοθεραπεία μου;

Τι είδους όψιμες παρενέργειες θα πρέπει να αναμένω μετά την ακτινοθεραπεία μου;

Για περισσότερες πηγές, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.mskcc.org/pe για να κάνετε αναζήτηση στην ψηφιακή μας βιβλιοθήκη.

About Image-Guided, Intensity-Modulated Radiation Therapy (IG-IMRT) to Your Prostate - Last updated on June 13, 2024

Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων που ανήκουν στο Κέντρο Αντιμετώπισης του Καρκίνου Memorial Sloan Kettering