



患者及照护者教育

关于您的消融手术

本信息介绍您在 MSK 的消融手术、预期情况以及如何做好准备。

什么是消融？

消融是一种能够杀死癌细胞的微创手术。通过皮肤上的小切口或针头完成微创手术。您的消融手术将由一名介入放射科 (IR) 医生完成。介入放射科医生（也称为 IR 医生）是专门从事影像引导下手术的医生。

消融手术有不同的类型，分别以不同的方式杀死癌细胞。医疗保健提供者将与您交流，告知您哪种类型最适合您。

在消融手术前，将对您进行麻醉（使用药物使您入睡）。

在消融手术过程中，IR 医生会将一种特殊的针插入您的皮肤。非常热或非常冷的温度通过针头杀死癌细胞。

IR 医生将使用 7 图像引导针头进入肿瘤。成像可能包括：

- X 线透视（实时 X 线）
- 计算机断层扫描 (CT)。
- 磁共振成像 (MRI) 扫描。
- 超声。

您的医疗保健提供者将决定您当天出院是否安全。若要当天出院，请务必确保有一名负责任的照护者接您回家。欲了解更多信息，请阅读本资源“安排人接您回家”部分。

许多患者消融后在医院过夜。请与您的医疗保健提供者讨论可能发生的情况。他们会根据需要帮助您制定计划。

消融前应完成的事项

成像检查

您的医疗保健提供者将使用既往 CT、MRI 或超声图像来决定您是否需要消融。IR 医生将使用这些图像来计划将针插入肿瘤的位置。

询问用药情况

您可能需要在手术前停用某些常用药物。您需要与您的医疗保健提供者讨论停用哪些药物对您是安全的。

我们在下面列举了一些常见的例子，但还有其他类型。确保您的医疗团队了解您服用的所有处方药和非处方药。处方药是指只能凭医疗保健提供者开具处方才可获得的药物。非处方药是指无需开具处方即可购买的药物。



在手术前几天内正确服药非常重要。如果没有这样做，我们可能需要取消您的手术。

血液稀释剂（抗凝剂）

血液稀释剂是一种能改变血液凝结方式的药物。

如果您正在服用任何血液稀释剂，请在手术前咨询负责为您做手术

的医疗保健提供者应如何处理。他们可能会告诉您在手术前的特定天数停止服药。这将取决于您所要接受的手术类型和您使用血液稀释剂的原因。

以下是常见血液稀释剂的示例。还有其他类型的血液稀释药物，请务必确保您的医疗团队了解您服用的所有药物。请勿在未咨询您的医疗团队成员的情况下停用您的血液稀释剂药物。

- 阿哌沙班 (艾乐妥®)
- 阿司匹林
- 塞来昔布 (西乐葆®)
- 西洛他唑 (Pletal®)
- 氯吡格雷 (波立维®)
- 达比加群 (泰毕全®)
- 达肝素 (法安明®)
- 双嘧达莫 (潘生丁®)
- 依度沙班 (Savaysa®)
- 依诺肝素 (Lovenox®)
- 磺达肝癸钠 (Arixtra®)
- 肝素 (皮下注射)
- 美洛昔康 (莫比可®)
- 非甾体抗炎药 (NSAID), 如布洛芬 (Advil®, Motrin®) 和萘普生 (Aleve®)
- 己酮可可碱 (巡能泰®)
- 普拉格雷 (Effient®)
- 利伐沙班 (拜瑞妥®)
- 柳氮磺胺吡啶 (Azulfidine®、Sulfazine®)
- 替格瑞洛 (倍林达®)
- 亭扎肝素 (Innohep®)
- 华法林 (Jantoven®、Coumadin®)

请阅读*如何确定药物或补充剂中是否含有阿司匹林、其他 NSAID、维生素 E 或鱼油* (www.mskcc.org/zh-hans/cancer-

[care/patient-education/common-medications-containing-aspirin-and-other-nonsteroidal-anti-inflammatory-drugs-nsaids](#))。其中包含关于术前您必须避免使用的药物信息。

糖尿病药物

如果您正在使用胰岛素或其他糖尿病药物，请咨询为您开具此处方的医疗保健提供者，了解在手术前应如何处理。您可能需要停止服用这类药物，或服用与平时不同的剂量。在手术前，您可能还需要遵循不同的饮食指示。请遵循医疗保健提供者的指导说明。

您的医疗团队会在手术期间检查您的血糖水平。

利尿剂（水丸）

利尿剂是一种有助于控制体内液体积聚的药物。利尿剂的例子包括氢氯噻嗪 (Microzide[®]) 和呋塞米 (Lasix[®])。

如果您正在服用任何利尿剂，请在手术前咨询负责为您做手术的医疗保健提供者应如何处理。您可能需要在手术当天停用该药物。

取下皮肤上的医疗设备

您可能在皮肤上佩戴了某些医疗设备。在进行扫描或程序前，医疗设备制造商建议您取下：

- 连续血糖监测仪 (CGM)
- 胰岛素泵

您可以与您的医疗保健提供者讨论将您的预约安排在更接近您需要更换这些设备的日期。扫描或手术结束后，请确保您有一个额外的设备可供佩戴。

您可能不确定如何在不佩戴设备时管理您的血糖。 如果不确定，请在预约前询问治疗您糖尿病的医疗保健服务提供者。

安排人接您回家

疗程后请务必确保有一名负责的照护者接您回家。负责的照护者必须能够帮助您安全回到家中。如果他们有任何问题，应能够联系您的医疗团队。请务必在疗程开始前将此事安排好。

如果没有负责的照护者接您回家，您可以致电以下服务机构。他们会安排人送您回家。此项服务需要付费，并且您需要提供交通工具。您可以乘坐出租车或使用汽车服务，但必须保证有一个负责的照护者陪同。

纽约的服务机构

VNS 健康：888-735-8913

Caring People：877-227-4649

新泽西的服务机构

Caring People：877-227-4649

如果您有任何生病不适请告知我们

如果您在手术前出现任何不适（包括发烧、感冒、喉咙痛或流感），请致电您的 IR 医生。您可以在周一至周五上午 9:00 至下午 5:00 致电联系。

下午 5:00 后或在周末和节假日，请致电 212-639-2000。联系值班的介入放射科医生。

请记住您的预约时间

工作人员会在手术前 2 个工作日给您打电话。如果您的手术安排在周一，他们会在前一个周四致电您。他们将告知您应该于何时

到达医院接受手术。他们还会提醒您抵达的地点。

请使用该区域写下您的手术日期、时间和地点：

如果您在手术前的工作日中午（中午 12 点）前仍未接到我们的来电，请致电 646-677-7001。如果您因任何原因需要取消手术，请致电为您安排手术的医疗保健提供者。

消融前一天应完成的事项

进食指导说明



手术前的午夜（凌晨 12 点）后请停止进食。包括硬糖和口香糖。

如果医疗保健提供者告知您在午夜之前停止进食，请遵照其指示。有些人需要在手术前禁食（不吃东西）更长时间。

消融当天应完成的事项

液体摄入指导说明

午夜（凌晨 12 点）至抵达时间前 2 小时，只能饮用以下所列的液体。请勿进食或饮用其他任何饮品。抵达时间前 2 小时停止饮用。

- 水。

- 透明的苹果汁、葡萄汁或蔓越莓汁。
- Gatorade 或 Powerade。
- 黑咖啡或清茶。可以添加糖。请勿添加任何其他东西。
 - 请勿添加任何含量任何类型的牛奶或奶精。包括植物奶和奶精。
 - 请勿添加蜂蜜。
 - 请勿添加风味糖浆。

如果您患有糖尿病，请注意这类饮料中的含糖量。如果摄入这类饮料的无糖、低糖或无添加糖版本，会更容易控制血糖水平。

在手术前保持水分会有所帮助，因此如果口渴请饮用液体。请勿超出所需的饮水量。手术期间，您将接受静脉 (IV) 输液。



抵达时间前 2 小时停止饮用。包括水。

消融前一天需牢记的事项

- 请仅服用您的医生告知您在手术当天早晨可服用的药物。请喝几口水送服。
- 请勿涂抹身体乳膏、乳液或凡士林 (Vaseline®)。您可以使用除臭剂和面部保湿剂。
- 请不要化眼妆。
- 穿着宽松舒适的衣服。
- 请取下所有的首饰，包括身体穿孔。

- 请将不需要使用的贵重物品留在家中。
- 如果您习惯配戴隐形眼镜，如果可能，请换成镜框眼镜。如果您没有镜框眼镜，请携带您的隐形眼镜盒

消融当天应随身携带的物品

- 治疗呼吸问题的药物（如有的话）。包括吸入器和治疗胸痛的药物。
- 如果您佩戴连续血糖监测仪 (CGM)，请携带一个额外的备用。
- 镜框眼镜或隐形眼镜盒（如果您平时戴眼镜）。
- 义齿胶（如果您佩戴义齿）。您的医疗保健代表委托书（如果您已完成）。
- CPAP 或 BiPAP 机（如您使用的话）。如果您无法随身携带这些设备，我们将在您住院期间为您提供。

抵达医院后有关消融的预期情况

许多工作人员会要求您说出并拼写出您的姓名和出生日期。这是为了您的安全考虑，姓名相同或相似的患者可能会在同一天接受手术。

当到您该为手术更衣时，我们会为您提供医院病号服、长袍、手术帽和防滑袜更换。您需要取下假体装置、假发和宗教物品（如果有）。

与护士见面

您将在手术之前与您的护士见面。请将您在午夜之后服用的任何药物的剂量及服用时间告知他们。请确保包括处方药、非处方

药、贴片和药膏。

护士可能会在您的一根静脉中放置一根静脉注射 (IV) 管线，通常是您的手臂或手上的静脉。如果您已置入中心静脉导管 (CVC)，他们可能会使用您的 CVC。常见的 CVC 包括：

- 一个植入式输液港。
- 一个 Hickman® 导管。
- 一个经外周静脉置入中心的静脉导管 (PICC) 管路。

与麻醉师见面

您将与麻醉师见面。麻醉师是指在麻醉方面受过特殊训练的医生。他们将在手术期间给您输送麻醉药。此外，他们还将：

- 与您一起查看您的病史。
- 询问您既往使用麻醉药是否曾出现过问题。包括恶心（感觉想吐）或疼痛。
- 和您谈论手术过程中的舒适度和安全性。
- 和您谈论您将接受哪种麻醉。
- 回答您提出的麻醉相关问题。

Going Into the Procedure Room

When it's time for your procedure, you'll remove your hearing aids, glasses, and dentures, if you have them. You'll either walk into the procedure room or a staff member will bring you there on a stretcher.

Inside the Procedure Room

A member of your care team will help you onto the bed. They will place compression boots on your lower legs. These gently inflate and deflate to help blood flow in your legs.

Once you're comfortable, your anesthesiologist will give you anesthesia through your IV line and you'll fall asleep. You'll also get fluids through your IV line during and after your procedure.

根据您的消融类型，可能需要在您的大腿上安装接地垫。这些接地垫是为了您的安全考虑。您的护理团队会对您的腿部安装接地垫的位置进行剃毛。这有助于更好粘贴接地垫。

您的医疗保健提供者会用抗菌剂清洁您的皮肤。这是一种用于杀灭病菌和细菌的液体。您的护理团队会在消融后清洁该位置。您的皮肤可能会在短时间内呈现橙色。一天之内就会消失。

您的医疗保健提供者将为您进行局部麻醉。该药物用来麻醉将针扎进皮肤的部位。随后，IR 医生将使用实时成像扫描引导针头进入您的肿瘤。

消融后

在麻醉复苏室 (PACU) 内

手术后，您将在麻醉复苏室 (PACU) 内醒来。护士会追踪记录您的体温、脉搏、血压和氧气水平。您可能会通过位于鼻子下方的一根细管，或覆盖鼻子和嘴部的面罩来获得氧气。我们还会将压缩靴穿戴于您的小腿上。

扎针的部位会覆盖一小块敷料（绷带）。您的护士将指导您如何在家中更换敷料以及自我护理。

如果您感到疼痛，请告知您的护士。他们可能会给您缓解疼痛的药物。在您离开医院前，护士将为您取出 IV 管线。

您可询问护士您在 PACU 预期停留的时间。如果您需要在医院过夜，工作人员会将您转移到普通病房。如果您当天就出院，您的医疗保健提供者将告诉您何时可以安全使用。您将需要有一名负责任的照护者接您回家。

安排随访检查和预约

您将接受随访影像检查和医生预约访视。这些都是为了确保消融治疗已经彻底将肿瘤消灭。如果还未给您安排随访影像学检查，请致电您的医生办公室。

何时电话联系您的医疗保健提供者

如果您在消融治疗后出现以下情况，请致电给为您做手术的 IR 医生：

- 发热达 100.4°F (38.3 °C) 或更高。
- 呼吸困难，尤其是做过肺消融术后。
- 疼痛、恶心或呕吐相较您治疗前加重。
- 扎针或放置接地垫的部位周围出现发红、肿胀或疼痛。
- 任何新发症状。
- 对手术有任何疑问或担忧。

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

有关更多资源，请访问 www.mskcc.org/pe，在我们的虚拟图书馆中进行搜索。

About Your Ablation Procedure - Last updated on December 12, 2022
Memorial Sloan Kettering Cancer Center 拥有和保留所有权利