



患者及照护者教育

预防造影剂过敏反应

本信息适用于曾对造影剂出现过敏反应的患者。其中介绍了如何预防在扫描过程中对造影剂产生过敏反应。

关于造影剂

造影剂是一种用于成像扫描的特殊染料。它能使扫描图像更加清晰，帮助医生更清晰地观察您的器官。

造影剂有多种类型。计算机断层扫描 (CT) 扫描和磁共振成像 (MRI) 使用不同类型的造影剂。即使您对某一种造影剂有过敏反应，也并不意味着您在接受另一种造影剂之前需要服用药物。

您曾对造影剂过敏，且您正在进行的扫描需要相同类型的造影剂。由于您有过敏反应，因此在扫描前需要服用类固醇药物和抗组胺药。这将有助于防止再次发生过敏反应。

按照计划，您需要在 _____（日期）的上午/下午
_____ 接受 _____ 扫描。

利用药物预防造影剂过敏反应

您可以服用不同的药物来预防造影剂的过敏反应。如有需要，您的医生可以为您开具药物处方。

以下是一些用于预防造影剂过敏反应的药物。如果您对何时服药有任何疑问，请咨询护士。

强的松

如果医生为您开具了强的松，请在扫描前服用 3 剂：

- 扫描前 13 小时服用第 1 剂。
- 扫描前 7 小时服用第 2 剂。
- 扫描前 1 小时服用第 3 剂。

在下方填写您需要服药的时间。

在下述时间服用 1 片强的松（50 毫克）：

_____（日期）的上午/下午 _____（扫描前 13 小时）

_____（日期）的上午/下午 _____（扫描前 7 小时）

_____（日期）的上午/下午 _____（扫描前 1 小时）

在扫描前 1 小时，服用 50 毫克 (mg) 的苯海拉明 (Benadryl) 和最后一剂强的松。如果您对苯海拉明过敏或不想昏昏欲睡，可以服用 10 毫克西曲嗪塞替利嗪 (Zyrtec) 来代替。

甲基强的松龙

如果医生为您开具了甲基强的松龙，请在扫描前服用 2 剂：

- 扫描前 12 小时服用第 1 剂。
- 扫描前 2 小时服用第 2 剂。

在下方填写您需要服药的时间。

在下述时间服用 1 片甲基强的松龙（32 毫克）：

_____（日期）的上午/下午 _____（扫描前 12 小时）

_____（日期）的上午/下午 _____（扫描前 2 小时）

您可能还需要在扫描前 1 小时服用 50 毫克的苯海拉明。如果您需要服用，您的医生会告诉您。如果您对苯海拉明过敏或不想昏昏欲睡，可以服用 10 毫克西曲嗪塞替利嗪 (Zyrtec) 来代替。

其他药物

您可能需要服用更多药物或不同的药物来代替。请遵医嘱。

如果您对您的术前用药计划有任何疑问，请致电为您安排术前用药计划的医生。

在上午/下午 _____（扫描前 1 小时）服用 _____。

备注

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

有关更多资源，请访问 www.mskcc.org/pe，在我们的虚拟图书馆中进行搜索。

Preventing An Allergic Reaction to Contrast Dye - Last updated on January 4, 2024

Memorial Sloan Kettering Cancer Center 拥有和保留所有权利